

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el promedio de ocupantes por dormitorio se redujo de 2.6 en el año 2000 a 2 en el 2010, lo cual coincide con el hecho de que el número de hogares aumentó de 29.5 millones a 31.4 millones en ese mismo periodo.¹

El promedio de renta en localidades menores a 2 500 habitantes es de \$1 403, mientras que en aquellas con más de 100 000 habitantes el monto es de \$2 120. Los precios son variables: \$1 913 para una vivienda independiente, \$2 077 para una vivienda en vecindad y \$3 154 para un departamento en edificio. Por entidad federativa, los extremos en cuanto al precio promedio de renta corresponden a Guerrero, con menos de \$ 1000, y al DF, cercano de los \$ 4 000.

Los datos más recientes indican que a finales de 2013 se registraron 119 960 casas abandonadas en el país.

¹Fuente: <http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EdoActualVivienda/Documents/EAVM%202014%20v f.pdf>

Visto en: <http://www.cronica.com.mx/notas/2015/882585.html>

PAÍSES CON MÁS MÉDICOS POR HABITANTE

De acuerdo con la OMS, Qatar ocupa el primer lugar a nivel internacional en cuanto al número de médicos por cada 10 000 habitantes*, con 77.4 médicos por 10 000 habitantes, seguido por Mónaco con 71.7, Cuba con 67.2, San Marino con 51.3 y Austria con 48. La media internacional es de 12.8 médicos por cada 10 000 habitantes, en Europa es de 33.1 y en América de 20.8, en tanto que la tasa más baja se presenta en África con 2.6.²



El 45.8% de los países miembros de la OMS tiene menos de un médico por cada 1 000 habitantes.

*Los resultados presentados se basan en un análisis que no toma en cuenta el dato de un año sino la media de los últimos ocho, es decir, en el atlas de 2014 se registra un promedio de los datos entre 2006 y 2013. El objetivo de esta forma de presentar los datos es evitar que haya variaciones súbitas interanuales por motivos extraordinarios, por lo que sirve para medir mejor una tendencia.

² Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf?ua=1

Visto en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/23/actualidad/1400872924_659170.html

USUARIOS DE *ECOBICI* EN EL DISTRITO FEDERAL

El número de usuarios registrados en el sistema de transporte Ecobici del 16 de febrero del 2010 a la fecha es de 120 000, de los cuales el 63% corresponde a hombres y el 37% a mujeres. El intervalo de edad que utiliza mayormente este sistema es el de 30 a 34 años con el 23%, seguido de cerca por el de 25 a 29 años con un 22%. En cuanto al grado de escolaridad de los usuarios, destacan los que cuentan con licenciatura con un 60% del total, seguido por los de bachillerato o posgrado con un 17% cada uno.³

El 66% de los viajes tiene como objetivo acudir al trabajo o se relaciona con él, un 6% para ir a comer, ir de compras y actividades de ocio (5% cada uno), ir a estudiar y realizar algún trámite (4% cada uno), mientras que un 10% indica que es por “otros motivos”. Un 53% de los viajes sólo emplea este sistema para llegar a su destino, en tanto que el resto lo combina con otros medios de transporte, como colectivo (18%), metro (11%), metrobús (10%) y automóvil (4%).

³ Fuente: <http://www.df.gob.mx/index.php/ecobici>

Visto en: http://www.milenio.com/df/Ecobici-aniversario-Distrito_Federal-Ciudad_de_Mexico_5_247825237.html

DATOS SOBRE EXCLUSIÓN, INTOLERANCIA Y VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)*, el 72% de los hombres afirma haber sufrido algún tipo de agresión o violencia en sus escuelas, contra un 65.2% de mujeres.⁴



Con una media de 13.2%, los estudiantes aceptan generar la violencia “a veces”, es decir, lo afirma un 18.1% de hombres frente a un 8.4% de mujeres.

*La encuesta se realizó mediante un muestreo probabilístico en 150 planteles de educación media superior de las diferentes modalidades (general, tecnológico y profesional técnico), aplicando 10 cuestionarios por plantel para obtener un tamaño de muestra de 1500 estudiantes.

⁴Fuente: http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11599/5/images/sems_encuesta_violencia_reporte_130621_final.pdf

Visto en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/20/abuso-sexual-antes-10-anos-46-casos>

BALAS PERDIDAS EN ZONA METROPOLITANA

Víctimas por balas perdidas son aquellas heridas o muertas por un proyectil de quien se desconoce qué persona perpetró la detonación. De acuerdo con esto, la Procuraduría General de Justicia del DF informa que del 2006 a octubre del 2014 se han registrado 84 víctimas por bala perdida, 10 de los cuales fallecieron y el resto tuvo heridas (de éstas no se especifica la gravedad de las lesiones).⁵

El 37% de los lesionados se integra con personas adultas de 31 a 59 años de edad y el 73% de los percances ocurrió en la vía pública. Del total, 50% se verificó en Iztapalapa.


Las cifras presentan altibajos, ya que en el 2010 resultaron lesionadas siete personas por balas perdidas, en 2011 repuntó a 23 casos, para el 2012 la cifra se redujo a 12 y siguió en descenso hasta llegar en 2013 a 9 casos. En 2014, los lesionados aumentaron a 25.

En cuanto a géneros, 60 de los lesionados fueron hombres y 24 mujeres.

⁵ Fuente: <http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/balas-perdidasiimpactan-a-dos-al-mes-130095.html>

PERFIL DE SEGUIDORES DEL ESTADO ISLÁMICO (EI) EN TWITTER*

En el año 2010 surgieron 182 cuentas para seguir al EI, 2 380 en 2012 y en 2014 se crearon 11 902 cuentas de usuarios; así se alcanzó un total de 46 000 usuarios en diciembre del 2014.⁶



Un 20% de los comentaristas en Twitter usa el inglés como idioma para expresarse, en tanto que alrededor del 75% lo hace mediante el árabe.

*De acuerdo con expertos, para que un usuario de Twitter se considere seguidor del Estado Islámico (EI) no basta con que difunda las actividades del grupo, sino que debe seguir su perfil.


⁶ Fuente: <http://www.brookings.edu/research/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan>

Visto en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/06/actualidad/1425670617_076387.html

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD DE ALGUNAS DROGAS*

Una reciente publicación de la revista *Scientific Reports* indica que consumir marihuana es 114 veces menos mortal que ingerir alcohol.⁷



DIFERENCIA ENTRE LA DOSIS TÓXICA QUE PUEDE SER MORTAL Y LA INGESTIÓN HUMANA TÍPICA

El alcohol se ubica en la clasificación de “alto riesgo”, el consumo de tabaco, heroína, éxtasis, metanfetaminas y cocaína en “riesgo” y la marihuana en “bajo riesgo”.

*Para clasificar las sustancias en función de su mortalidad, los investigadores compararon la dosis que resulta mortal en cada una de ellas y la dosis media que se consume. Esto significa que la cantidad necesaria de marihuana que una persona debe consumir para morir es muy superior a la que suele consumirse, por lo que el riesgo de morir por una sobredosis de marihuana es mucho menor. Por otro lado, la diferencia entre la cantidad de alcohol que habitualmente consume una persona y la sobredosis que puede ocasionarle la muerte es mucho menor, de ahí su clasificación como de alto riesgo.

⁷ Fuente: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/>

Visto en: <https://es.noticias.yahoo.com/el-alcohol-es-114-veces-m%C3%A1s-mortal-que-la-marihuana-130441042.html>

ESTADÍSTICAS SANITARIAS A NIVEL MUNDIAL

Una niña y un niño nacidos en el año 2012 tendrán por término medio una esperanza de vida de 72.7 y 68.1 años, 6 años más que la media mundial de la esperanza de vida de los nacidos en 1990.⁸

La mitad de las 20 principales causas de muerte en el mundo son enfermedades infecciosas o de carácter materno, neonatal y nutricional, mientras que la otra mitad corresponde a enfermedades no transmisibles o lesiones. En África, el 70% de los “años de vida perdidos” (APP) se debe a las enfermedades infecciosas o carácter materno, neonatal y nutricional, mientras que en los países de ingresos altos estas causas sólo representan hoy día un 8% de todos los APP.

La mortalidad de los menores de 5 años en el año 2000 era de 75 por cada 1 000 nacidos vivos, en tanto que en 2012 la cifra se redujo a 48 muertes. En México, la cifra en 2013 era de 15.7 y, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tasa debe descender a 13.7 para el presente 2015.

⁸Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf